

## SCHEDA TECNICA

<b>NOME COMMERCIALE</b>	<b>ZIG ZAG RATT BRODI PLUS H.P.</b> ESCA TOPICIDA IN PASTA FRESCA PRONTA ALL'USO
<b>CODICE ARTICOLO DEISA EBANO</b>	437
<b>CODICE EAN</b>	8004235004378
<b>REGISTRAZIONE MINISTERIALE</b>	BIOCIDA (PT14) IT/2017/00444/AUT
<b>CONFEZIONE E RICAMBI</b>	CARTONE DA 12 SACCHETTI OGNI SACCHETTO CONTIENE 150 GR DI PRODOTTO IN 15 ESCHE DA 10 GR
<b>COMPOSIZIONE</b>	100 g di prodotto contengono: Brodifacoum (N°CAS 56073-10-0) g 0,0025 Denatonio Benzoato (N°CAS 3734-33-6) g 0,001 Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a g 100



### CARATTERISTICHE TECNICHE

ZIG ZAG BRODI PLUS H.P. è un'esca rodenticida pronta all'uso a base di una sostanza attiva anticoagulante, nota come Brodifacoum, efficace contro Topolino domestico (*Mus musculus*), Ratto grigio (*Rattus norvegicus*), anche dopo una singola ingestione. La formulazione consiste in una pasta fresca appetibile per le specie di roditori indicate. Il prodotto non allerta e non ingenera sospetti agli altri componenti della popolazione di roditori. ZIG ZAG BRODI PLUS H.P. contiene una sostanza amaricante volta a prevenire l'ingestione accidentale da parte dei bambini. ZIG ZAG BRODI PLUS H.P. può essere usato all'interno ed intorno degli edifici quali, ad esempio, abitazioni, cantine, garage, ripostigli e giardini di proprietà.

### MODALITA' DI IMPIEGO

Usò all'interno di edifici per il controllo del Topolino domestico (*Mus musculus*): Posizionare 20-40 g di ZIG ZAG BRODI PLUS H.P. per contenitore, pari a 2-4 esche in pasta fresca pronti all'uso da 10 g ciascuno. Laddove dovessero essere necessari più contenitori posizzionarli ad una distanza di circa 10-15 metri l'uno dall'altro e comunque ad una distanza non inferiore ai 5 metri. I contenitori dovrebbero essere ispezionati ogni 2-3 giorni all'inizio del trattamento e poi almeno settimanalmente. Ciò al fine di verificare l'integrità del contenitore, il consumo dell'esca, ed eventualmente per rimuovere le carcasse dei roditori. Quando necessario reintegrare l'esca. Usò all'interno di edifici per il controllo del Ratto grigio (*Rattus norvegicus*): Posizionare 100-200 g di ZIG ZAG BRODI PLUS H.P. per contenitore, pari a 10-20 esche in pasta fresca pronti all'uso da 10 g ciascuno. Laddove dovessero essere necessari più contenitori posizzionarli ad una distanza di circa 5-10 metri l'uno dall'altro e comunque ad una distanza non inferiore ai 5 metri. I contenitori dovrebbero essere ispezionati ogni 5-7 giorni all'inizio del trattamento e poi almeno

## SCHEMA TECNICA

settimanalmente. Ciò al fine di verificare l'integrità del contenitore, il consumo dell'esca, ed eventualmente per rimuovere le carcasse dei roditori. Quando necessario reintegrare l'esca. Uso all'esterno intorno agli edifici Per il controllo del Ratto grigio (*Rattus norvegicus*). Posizionare 100-200 g di ZIG ZAG BRODI PLUS H.P. per contenitore, pari a 10-20 esche in pasta fresca pronti all'uso da 10 g ciascuno. Laddove dovessero essere necessari più contenitori posizzarli ad una distanza di circa 5-10 metri l'uno dall'altro e comunque ad una distanza non inferiore ai 5 metri. Posizionare i contenitori con le esche in aree non soggette ad allagamenti. Sostituire le esche nei contenitori se danneggiate da acqua o contaminate da sporcizia. I contenitori con le esche dovrebbero essere controllati almeno ogni 5-7 giorni all'inizio del trattamento e almeno settimanalmente in seguito, al fine di controllare se l'esca è accettata, i contenitori sono integri e per rimuovere i corpi dei roditori. Riempire il contenitore quando necessario.

### PRECAUZIONI D'USO

**ALLA FINE DEL PERIODO DI TRATTAMENTO RIMUOVERE LE ESCHE RIMASTE O I CONTENITORI CONTENENTI LE ESCHE. NON APRIRE IL SACCHETTINO DI CARTA ALIMENTARE CONTENENTE LA PASTA FRESCA. PERICOLOSO PER LA FAUNA SELVATICA.**

**MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO** Considerare misure preventive di controllo al fine di favorire l'assunzione del prodotto e ridurre la probabilità di re-infestazione (ad esempio ostruire possibili aperture, rimuovere potenziali fonti di cibo e bevaggio quanto più possibile). Non utilizzare i rodenticidi anticoagulanti come esche permanenti (ad esempio per prevenire eventuali infestazioni o per monitorare attività dei roditori). L'utilizzo di questo prodotto dovrebbe eliminare i roditori entro 35 giorni. In caso di sospetta inefficacia al termine del trattamento (ad esempio si osserva ancora attività di roditori), chiedere suggerimenti al fornitore di prodotto o chiamare un Servizio di disinfestazione. Verificare la presenza di roditori morti e rimuoverli durante il trattamento, almeno con la stessa frequenza di visita dei contenitori per esche. Alla fine del trattamento, smaltire l'esca non consumata e la confezione secondo la normativa vigente. Conservare in un luogo asciutto, fresco e ben ventilato. Conservare il contenitore chiuso e al riparo dalla luce diretta del sole. Conservare in un luogo inaccessibile per bambini, uccelli, animali domestici e da fattoria.

### INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Questo prodotto contiene una sostanza anticoagulante. Se ingerito, i sintomi, che possono essere ritardati, possono includere sanguinamento dal naso o dalle gengive. In casi gravi, possono manifestarsi ematomi e presenza di sangue nelle feci ed urine. Antidoto: Vitamina K1 somministrabile solo da personale medico/veterinario. In caso di: Esposizione cutanea, lavare la pelle con acqua e poi con acqua e sapone. Esposizione oculare, risciacquare gli occhi con acqua o con liquido per lavaggio oculare, tenere le palpebre aperte per almeno 10 minuti. Esposizione orale, sciacquare accuratamente la bocca con acqua. Non somministrare nulla per bocca ad una persona priva di sensi. Non provocare il vomito. In caso d'ingestione, contattare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta del prodotto. Contattare un medico veterinario in caso d'ingestione da parte di un animale domestico.