

SCHEDA TECNICA

NOME COMMERCIALE	ZIG ZAG BLATTICIDA/ SCARAFAGGI E FORMICHE	
CODICE ARTICOLO DEISA EBANO	80	
CODICE EAN	8004235000134	
REGISTRAZIONE MINISTERIALE	18695	
CONFEZIONE E RICAMBI	80: RIEMPIMENTO 600 ML, IMBALLO DA 18PZ	
COMPOSIZIONE	tetrametrina 0.15g Peretrina cis/trans 0.15 g Piperonil butossido 0.7 g D- fenotrin :0.10g Solventi e propellenti q.b. a 100 g	
CARATTERISTICHE TECNICHE	Insetticida spray specifico per i trattamenti terra – muro, dall’elevata azione snidante, efficacia immediata e residuale Validità 4 anni.	
MODALITA' DI IMPIEGO	Agitare bene prima dell’uso, erogare Zig Zag Blaticida ai margini del pavimento, nelle crepe, dietro i mobili e lungo le tubazioni da una distanza di 20/30 cm per 2 secondi per mq.	
PRECAUZIONI D’USO	Estremamente infiammabile. Irritante per la pelle. L’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non mangiare, né bere, né fumare durante l’impiego. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l’etichetta). Non usare il prodotto in modo differente da come indicato in etichetta. Evitare un uso eccessivo od improprio del prodotto. Non nebulizzare nell’aria ambiente. Se il prodotto viene impiegato in luogo dove si soggiorna	

SCHEDA TECNICA

lungamente o nelle camere da letto, aerare sufficientemente il locale prima di soggiornarvi nuovamente. Evitare di inalare direttamente il getto e di spruzzarlo negli occhi. Non eccedere nell'uso. Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore ai 50°C. non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su fiamma o corpo incandescente . conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. non fumare. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Controindicazioni : Ipersensibilità accertata verso il prodotto. Contiene: permetrine può provocare reazione allergica.

ISTRUZIONI PER IL MEDICO

L'associazione dei seguenti principi attivi (tetrametrina 0,15 %, permetrina 25/75 0,15% e piperonil butossido 0,7%)provoca i seguenti sintomi di intossicazione: tetrametrina e permetrina: blocco della trasmissione nervosa; piperonil butossidi : - Antidoto specifico: terapia sintomatica e di rianimazione. Consultare un Centro Antiveleni